

効能・効果 飲みすぎ、胃弱、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食べすぎ、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胸やけ、胸つかえ、胃もたれ、胃部・腹部膨満感

用法・用量 成人(15歳以上)1日2回、1回1瓶を服用してください。15歳未満は服用しないでください。服用間隔は4時間以上おいてください。●用法・用量を厳守してください。

成分・分量 1日量2本(60mL)中
ウルソデオキシコール酸 30mg、オウレン流エキス 0.2mL(原生薬換算量:200mg)、カンゾウ抽出粉末50mg(原生薬換算量:714.5mg)、ケイヒ流エキス0.8mL(原生薬換算量:800mg)、ゲンチアナエキス60mg(原生薬換算量:300mg)、ショウキョウ流エキス 0.4mL(原生薬換算量:400mg)、ソウジュツ流エキス 0.5mL(原生薬換算量:500mg)、チンピエキス 200mg(原生薬換算量:1000mg)、ニンジン流エキス0.4mL(原生薬換算量:400mg) 添加物:ウイキョウ流エキス、センブリ流エキス、精製白糖、D-ソルビトール液、クエン酸ナトリウム水和物、エタノール、水酸化ナトリウム、プロピレングリコール、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブチル、ポリリン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエステル、シリコーン樹脂、ハッカ油、グリセリン、L-メントール、バニリン、香料

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用
期限

製造
番号

薬草の胃腸薬

食べすぎ 消化不良 胃もたれ

二日酔・悪酔のむかつき

ウルソデオキシコール酸配合

サーボン[®] 胃腸内服液

第3類医薬品 30mL

製造販売元
日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田塚野80-1

サーボン胃腸内服液

⚠️使用上の注意



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 2.2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 5.本剤は生薬を配合していますので、成分が沈殿することがありますが、薬効には変わりありません。よく振って服用してください。

お問い合わせ先 ☎0120-415-688
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ガラス:瓶 金属:キャップ



4